

しってる!? 新型コロナウイルス感染症とワクチン



新型コロナウイルス感染症は どんな病気？

- のどの痛みや咳、鼻水・鼻づまりなどに
けんたいかん
加え、倦怠感や発熱、筋肉痛などの
症状が起こることが多い
- インフルエンザに似た症状のため、
症状だけでどちらかを見分けることは難しい



厚生労働省：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き第10.1版[2024年9月閲覧]<https://www.mhlw.go.jp/content/001248424.pdf>より作成

企画



武田薬品工業株式会社

しってる!? 新型コロナウイルス感染症とワクチン

新型コロナウイルス感染症は どのように感染するの？

●エアロゾル感染、飛まつ感染、接触感染でうつる

エアロゾル
感染



飛まつ
感染



※会話やくしゃみなどにより感染者のしぶき
(つばなど)を吸い込んでしまう。

接触
感染



●発症前から発症後5～10日は感染させる可能性がある

国立感染症研究所:新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染経路について[2024年9月閲覧]<https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/11053-covid19-78.html>より作成
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き第10.1版[2024年9月閲覧]<https://www.mhlw.go.jp/content/001248424.pdf>より作成

企画



武田薬品工業株式会社

しってる!? 新型コロナウイルス感染症とワクチン



発症したらいつまで休まないといけないの？

- 症状が出てから5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで、登園・登校は停止



文部科学省:学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)[2024年9月閲覧]https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_ope01-000004520_2.pdfより作成

企画



武田薬品工業株式会社

しってる!? 新型コロナウイルス感染症とワクチン




新型コロナウイルス感染症の 重症化のリスクは？

- 高齢者の方は重症化のリスクが高いと言われています

30歳代と比較した場合の各年代の重症化率

※「重症化率」は、新型コロナウイルス感染症と診断された症例（無症状を含む）のうち、集中治療室での治療や人工呼吸器等による治療を行った症例または死亡した症例の割合。



厚生労働省：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き第10.1版[2024年9月閲覧]<https://www.mhlw.go.jp/content/001248424.pdf>より作成

厚生労働省：（2023年4月版）新型コロナウイルス感染症の「いま」に関する11の知識[2024年9月閲覧]<https://www.mhlw.go.jp/content/000927280.pdf>より作成

企画



武田薬品工業株式会社

しってる!? 新型コロナウイルス感染症とワクチン



新型コロナウイルス感染症の 重症化のリスクは？

- 高齢者の方以外にも基礎疾患のある方、一部の妊娠後期の方も重症化に注意が必要です



厚生労働省: (2023年4月版) 新型コロナウイルス感染症の「いま」に関する11の知識[2024年9月閲覧]<https://www.mhlw.go.jp/content/000927280.pdf>より作成

しってる!? 新型コロナウイルス感染症とワクチン



新型コロナウイルス感染症の 後遺症とは？

- ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善しますが、一部の方で症状が長引くこと(罹患後症状、いわゆる後遺症)があります

後遺症の例

- | | | | | |
|-----------|-------|---------|---------|---------|
| ■ 疲労感・倦怠感 | ■ 関節痛 | ■ 筋肉痛 | ■ 咳 | ■ 喀痰 |
| ■ 息切れ | ■ 胸痛 | ■ 脱毛 | ■ 記憶障がい | ■ 集中力低下 |
| ■ 頭痛 | ■ 抑うつ | ■ 嗅覚障がい | ■ 味覚障がい | ■ 動悸 |
| ■ 下痢 | ■ 腹痛 | ■ 睡眠障がい | ■ 筋力低下 | |

WHO(世界保健機関)は、罹患後症状について「新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないもの。通常は発症から3カ月経った時点にもみられる。」と定義しています。

厚生労働省:新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について[2024年9月閲覧]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.htmlより作成

しってる!? 新型コロナウイルス感染症とワクチン

新型コロナウイルス感染症の 予防には

- 換気、手洗い・手指消毒、マスク着用※が有効です

換気



手洗い



手指消毒



マスク
着用



※重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問するとき、混雑した電車、バスに乗車するとき。

厚生労働省：感染対策・健康や医療相談の情報[2024年9月閲覧]https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryououdan.html#h2_1より作成

企画



武田薬品工業株式会社

しってる!? 新型コロナウイルス感染症とワクチン

新型コロナウイルス感染症は ワクチンで重症化や発症を予防できる病気です

● 定期接種の対象者は以下の方です

✓ 65歳以上の方

✓ 60～64歳で対象となる方※

※心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。

定期接種は毎年秋冬に1回行うことができます
また接種費用は自治体(市区町村)によって異なります
詳しくは住民票のある自治体にお問い合わせください



厚生労働省:新型コロナウイルスワクチンQ&A [2024年9月閲覧]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.htmlより作成

企画



武田薬品工業株式会社

しってる!? 新型コロナウイルス感染症とワクチン



ワクチン接種を受けるときの留意点

◆一般的にワクチンを接種できない方

- ✓ 明らかに発熱(通常 37.5°C 以上)している方
- ✓ 重篤な急性疾患にかかっている方
- ✓ 本ワクチンの成分でアナフィラキシーを起こしたことがある方
- ✓ 上記以外に医師が予防接種を行うことが不適当な状態にあると判断した方

接種NG



新型コロナワクチンは医師が認めた場合には
他のワクチンと同時に接種することができます

新型コロナワクチンの
種類によって接種を受けるときの
注意点は異なります
詳細は医師とご相談ください

厚生労働省:新型コロナワクチンQ&A [2024年9月閲覧]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.htmlより作成

企画



武田薬品工業株式会社